

PRODUKTDATABLAD

Bromhexin, oral opløsning

Bromhexin DAK (herefter kaldet Bromhexin) virker slimløsnende og kan bruges ved hoste med sejt slim. Når du tager Bromhexin, vil der opstå en øget mængde slim i luftvejene, som kan hostes op. Bromhexin bruges endvidere ved tørre slimhinder i mund, svælg og øjne (Sjögrens syndrom).



Læs indlægsseddelen grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da denne indeholder vigtige oplysninger

Ingredienser: **Aktivt stof:** Bromhexinhydrochlorid. **Øvrige indholdsstoffer:** ethanol 96 %, fortyndet saltsyre (E 570) og rensat vand. **Smagsstof:** Levomenthol. **Sødestof:** Sorbitol (E 420). **Konserveringsstof:** Methylparahydroxybenzoat (E 218).

Indikation: Anvendes ved hoste med sejt slim

Ved hoste

- Voksne og børn over 10 år: 10 - 20 ml (8 - 16 mg) 3 gange daglig.
- Børn 6 - 10 år: 5 - 10 ml (4 - 8 mg) 3 gange daglig.
- Børn 2 - 5 år: 2,5 - 5 ml (2 - 4 mg) 3 gange daglig.

Dosering:

Ved Sjögrens syndrom

- Voksne: Op til 40 ml (32 mg) 3 gange daglig.

Ved nedsat nyre- og leverfunktion

- Det er nødvendigt at ændre dosis. Tal med din læge om doseringen.

OBS: Du må kun bruge Bromhexin til børn under 2 år efter lægens anvisning.

Kontraindikationer:

- Ulcus pepticum.
- Nyligt overstået hæmoptyse, da koagler kan opløses, hvorpå fornyet blødning kan indtræde.

Vær ekstra forsigtig med at tage Bromhexin

Advarsler og forsigtighedsregler:

- Hvis du har mavesår eller sår på tolvfingertarmen.
- Hvis du lider af epilepsi eller en leversygdom, må du kun tage Bromhexin efter aftale med din læge.
- Vær opmærksom på at Bromhexin indeholder alkohol.

Der er set alvorlige hudreaktioner, der kan være forårsaget af bromhexinhydrochlorid. Hvis du udvikler hududslæt (herunder forandringer i slimhinderne i f.eks. munden, halsen, næsen, øjnene eller på kønsorganerne), skal du stoppe med at tage Bromhexin og omgående kontakte din læge.

PRODUKTDATABLAD

Bromhexin, oral opløsning

Opbevaring:	Opbevares utilgængeligt for børn
Holdbarhed:	Se holdbarhedsdato på emballagen.
Håndtering og destruktion:	Aflever altid medicin rester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. Nr.
7554030	Bromhexin	Håndkøbsmedicin	150ml	Æske a 12 stk.	538978

ANSVARLIGT FIRMAER

Takeda Pharma Sp. z o.o., 12 Księstwa Łowickiego ST., 99-420 Łyszkowice, Polen