

Survimed® OPD

Sondeernæring, der er nem at optage for patienter med malabsorption



Til patienter med maldigestion/malabsorption, og hvor standard enteral ernæring ikke tåles, fx hos patienter med:

- Inflammatorisk tarmsygdom ¹
- Akuttarmsvigt ²
- Pankreatisk insufficiens ³
- Alvorlig akut pankreatitis
- Kemoterapi / strålebehandlingsinduceret enteritis ⁴
- Kritisk sygdom ⁵
- Cystisk fibrose ⁶
- Diarré ⁷

ESPEN Guidelines on Enteral feeding in Gastroenterology: Peptid-baserede produkter kan anvendes med sikkerhed til patienter med akut pankreatitis (A).⁸

Survimed® OPD er peptidbaseret og indeholder mellemkædede triglycerider (MCT), der nemt optages i tarmen. OPD er en forkortelse af Oligo-Peptid-Diet, fordi sondeernæringen indeholder peptider med forskellige længder.



Næringsindhold pr. 100 ml	Survimed® OPD	Survimed® OPD HN
Energi	101 kcal / 424 kJ	133 kcal / 562 kJ
Protein	4,5 g	6,7 g
Kulhydrater	14,3 g	18,3 g
heraf sukkerarter	0,8 g	1,1 g
heraf laktose	≤ 0,2 g	≤ 0,3 g
Fedt	2,8 g	3,7 g
heraf mættet fedt	1,5 g	2,10 g
heraf enkeltumættet fedt	0,7 g	0,9 g
heraf flerumættet fedt	0,60 g	0,8 g
heraf MCT	1,4 g	1,9 g
heraf EPA* og DHA**	0,04 g	0,06 g
ω6/ω3 ratio	3,5:1	3,6:1
heraf kolesterol	1 mg	1,2 mg
Fibre	< 0,1 g	< 0,1 g
Salt	0,2 g	0,34 g
Vand	85 ml	80 ml
Osmolaritet	290 mosmol/l	400 mosmol/l
Osmolalitet	340 mosmol/kg H₂O	480 mosmol/kg H₂O
Mineraler og sporstoffer:		
Natrium	80 mg (3,5 mmol)	135 mg (5,9 mmol)
Kalium	200 mg (5,1 mmol)	260 mg (6,6 mmol)
Klorid	83 mg (2,3 mmol)	120 mg (3,4 mmol)
Calcium	65 mg (1,5 mmol)	90 mg (2,2 mmol)
Magnesium	25 mg (1,0 mmol)	30 mg (1,2 mmol)
Fosfat	48 mg (1,5 mmol)	72 mg (2,3 mmol)
Jern	1,3 mg	2 mg
Zink	1,2 mg	1,8 mg
Kobber	133 µg	200 µg
Mangan	0,27 mg	0,4 mg
Jod	13,3 µg	20 µg
Fluor	0,13 mg	0,2 mg
Krom	6,7 µg	10 µg
Molybdæn	10 µg	15 µg
Selen	6,7 µg	10 µg
Vitaminer og andre næringsstoffer:		
Vitamin A	92 µg RE°	138 µg RE°
heraf β-karoten	22 µg RE°	33,3 µg RE°
Vitamin D ₃	1 µg	1,5 µg
Vitamin E	1,3 mg α-TE°°	2 mg α-TE°°
Vitamin K ₁	6,7 µg	10 µg
Vitamin B ₁	0,13 mg	0,2 mg
Vitamin B ₂	0,17 mg	0,26 mg
Niacin	1,0 mg / 1,97 mg NE°°°	1,3 mg / 2,77 mg NE°°°
Vitamin B ₆	0,16 mg	0,24 mg
Vitamin B ₁₂	0,27 µg	0,4 µg
Pantotensyre	0,47 mg	0,7 mg
Biotin	5 µg	7,5 µg
Folsyre	26,7 µg	40 µg
Vit. C	8 mg	12 mg
Kolin	36,7 mg	55 mg
Energifordeling (E%):		
Protein	18%	20%
Fedt	25%	25%
Kulhydrater	57%	55%
Fibre	0%	0%

* eicosapentaensyre ** docosahexaensyre ° retinol ækvivalenter (RE) °° alfa-tokoferol ækvivalenter (α-TE) °°° niacin ækvivalenter (NE)

1. Forbes A, Escher J, Hebuterne X, Klek S, Krznaric Z, Schneider S, et al. Clinical Nutr. 2017;36(2):321-47. 2. Klek S, Forbes A, Gabe S et al. Clinical Nutr. 2016;35(6):1209-18 3. Mirtallo JM, Forbes A, McClave SA, Jensen GL, Waitzberg DL, Davies AR. J Parenter Enteral Nutr. 2012;36(3):284-91 4. Blaser AR, Starkopf J, Alhazzani W et al. Intensive Care Medicine 2017;43(3):380-98 5. Schwarzenberg SJ, Hempstead SE, McDonald CM et al. Journal of Cystic Fibrosis 2016;15(6):724-35 6. McClave S, Taylor B, Martindale R et al. J Parenter Enteral Nutr. 2016;40(2):159-211 7. Lochs H, Dejong C, Hammarqvist F et al. Clinical Nutr. 2006;25:260-274 8. ESPEN Guidelines on Enteral feeding in Gastroenterology 9. The international Declaration on the Human Right to Nutritional Care "Vienna Declaration"

EN_0409/August 2023