



30x24 gram



UCD Medigel

Livsmedel för speciella medicinska ändamål.

UCD Medigel innehåller essentiella aminosyror och är lämplig för kostbehandling av Urea Cycle Disorder (UCD).

Dosering och administrering

UCD Medigel kan intas som dryck eller gel.

Tillredning av dryck:

1. Häll innehållet i en bägare och tillsätt ca 80 ml kallt vatten.
2. Skaka väl i ca. 10 sekunder.

Tillredning av gel:

1. Häll innehållet i en bägare och tillsätt ca 30 ml kallt vatten.
2. Skaka väl i ca. 10 sekunder.
3. Låt stå i 2 min. för att få en krämig gel.

UCD Medigel skall helst konsumeras direkt efter beredning. Kan dock förvaras i kylskåp upp till 24 timmar; skakas väl innan intag.

Näringsdeklaration		100 g	24 g			100 g	24 g			100 g	24 g
Energi	kj	1595	383	Vitamin C	mg	63	15	AMINOSYROR			
	Kcal	375	90	Vitamin D3	µg	14.6	3.5	L-aspartat	g	5.55	1.3320
Fett	g	0	0	Vitamin E	mg	9	2.2	L-leucin	g	5.25	1.2600
varav mättat fett	g	0	0	Vitamin K	µg	41	9.8	L-lysin	g	3.97	0.9528
Kolhydrater	g	45	11	MINERALER				L-arginin	g	3.93	0.9432
varav sockerarter	g	25	6	Kalcium	mg	1083	260	L-glutamin	g	3.79	0.9096
Proteinekvivalenter	g	41.7	10	Klorid	mg	583	140	L-valin	g	3.79	0.9096
Salt	g	1.1	0.3	Krom	µg	71	17	L-isoleucin	g	3.48	0.8352
VITAMINER				Järn	mg	14	3.4	L-prolin	g	3.21	0.7704
Biotin	µg	25	6	Fosfor	mg	825	198	L-alanin	g	3.12	0.7488
Kolin	mg	279	67	Jod	µg	138	33.1	Glycin	g	3.12	0.7488
Folsyra	µg	208	49.9	Magnesium	mg	167	40	L-treonin	g	2.67	0.6408
Niacin	mg	14	3.4	Mangan	mg	1.7	0.41	L-serin	g	2.45	0.5880
Pantotensyra	mg	5	1.2	Molybden	µg	50	12	L-histidin	g	2.09	0.5016
Vitamin B2	mg	1.2	0.29	Kalium	mg	938	225	L-cystin	g	1.43	0.3432
Vitamin B1	mg	1	0.24	Koppar	mg	0.8	0.19	L-tryptofan	g	1.11	0.2664
Vitamin A	µg (RE)	600	144	Selen	µg	35	8.4	L-metionin	g	0.89	0.2136
Vitamin B6	mg	1.1	0.26	Natrium	mg	379	91	L-aurin	mg	92	22.08
Vitamin B12	µg	2	0.48	Zink	mg	11	2.6	L-karnitin	mg	46	11.04

Viktigt

Doseringen bestäms i samråd med dietist eller läkare och bör endast användas under medicinsk tillsyn. Produkten är inte avsedd som enda näringskälla. Produkten är olämplig för andra än UCD patienter. Produkten är avsedd för barn från 6 månader. Produkten får inte ges parenteralt.

Osmolalitet: 24 g + 80 ml = 1637 osmol/kg.

Förvaring

Torr och svalt. Öppnad portionspåse skall användas omedelbart.

Distributör:

GHN Pharma Metabolic AB
Tel 031 303 33 99
info@ghnpharma.com